

## La presa in carico del paziente con malattia scheletrica: centri accreditati ISO a confronto

Percorso diagnostico terapeutico assistenziale Rete Oncologica Veneta metastasi ossee e tumori primitivi dell'osso  
F. Bertoldo (Vr), P. Ruggiani (Pd)



VI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA  
DI OSTEONCOLOGIA (ISO)

Padova, 14-15 Novembre 2017  
PALAZZO ZACCO

Presidenti: D. Santini, V. Zagonel

Comitato Scientifico ISO: A. Berruti, F. Bertoldo, N. Calipari, R. Casadei, T. Ibrahim, G. Lanzetta

Responsabili Scientifici: A. Brunello, S. Zovato

Con il patrocinio di:

Associazione Italiana  
di Oncologia Medica



Istituto Oncologico  
Veneto



Rete Oncologica  
Veneta



**Francesco Bertoldo**

UOC Medicina Interna  
Departmento di Medicina –Scuola di Medicina  
Università di Verona





## **PDTA RETE ONCOLOGICA VENETA**

P. Conte

### **METASTASI OSSEE**

**DA TUMORE NOTO**

F. Bertoldo

**DA TUMORE SCONOSCIUTO**

P. Ruggeri

**Dott. Alberto Bortolami**

Coordinamento tecnico-scientifico

Rete Oncologica del Veneto

## PDTA METASTASI OSSEE DA TUMORE NOTO

Bertoldo F. ( coordinatore)

Aliberti C.

Basso U.

Corti L.

Falci C.

Gori S.

Maruzzo M.


Perin B.

Sagarello M.

**Dott. Alberto Bortolami**


Coordinamento tecnico-scientifico

Rete Oncologica del Veneto



Rete Oncologica Veneta  
Ricerca, innovazione, assistenza

# PDTA Metastasi ossee di origine nota<sup>1</sup>






**Linee guida**  
**TRATTAMENTO DELLE**  
**METASTASI OSSEE**  
Edizione 2017




## TRATTAMENTO DELLE METASTASI SCHELETRICHE (MAMMELLA)



\* Questi farmaci hanno dimostrato di ritardare gli SRE e di ridurre/ritardare il dolore. Prima di iniziare questi farmaci indicata visita odontoiatrica preventiva ed eventuale bonifica del cavo orale. La durata ottimale della terapia farmacologica non è a tutt'oggi completamente definita.



## TRATTAMENTO DELLE METASTASI SCHELETRICHE (PROSTATA-RESISTENTE ALLA CASTRAZIONE)




\* Questi farmaci hanno dimostrato di ritardare gli SRE e di ridurre/ritardare il dolore. Prima di iniziare questi farmaci indicata visita odontoiatrica preventiva ed eventuale bonifica del cavo orale. La durata ottimale della terapia farmacologica non è a tutt'oggi completamente definita.




# TRATTAMENTO DELLE METASTASI SCHELETRICHE (PROSTATA - ORMONOSENSIBILE)



2017



2017



\* Questi farmaci hanno dimostrato di ritardare gli SRE e di ridurre il dolore. Prima di iniziare questi farmaci indicata visita odontoiatrica preventiva ed eventuale bonifica del cavo orale. La durata ottimale della terapia farmacologica non è a tutt'oggi completamente definita.



# PDTA Metastasi ossee di origine nota<sup>1</sup>

